

平成12年度病害虫発生予察 地区報第2号

平成12年7月17日
南部地域病害虫防除所

葉いもちが多発しています 出穂一週間前の防除を徹底しましょう

【概況】

葉いもちの発生が南部地域の各地で認められ、巡回調査及び防除員調査における発生地点率は57.1%と広範囲にわたっている。発病程度の高いほ場も多くみられ、特に上十三内陸部で発生が目立っている。

病害虫名	葉いもち
作物名	稲
1発生地	水南部
2発生量	多

3 地区報発令の根拠

- (1) 発生が広範囲に認められ、発病程度の高いほ場も散見されている(表-1)。
(2) 気温が高く経過していることから、いもち病の感染には好適であると考えられ、今後、更に発生が増加すると予想される。

表-1. 巡回調査及び防除員調査における葉いもち発生状況

地域	市町村	調査地點	調査月日	発病株率	地域	市町村	調査地點	調査月日	発病株率
上 北	十和田市	相坂	7/11	10.0	三 ハ	東通村	蒲野沢	7/12	0
		大洞	7/11	16.0			蒲野沢	7/12	2.0
		板ノ沢	7/12	8.0			蒲野沢	7/12	16.0
		晴山	7/12	12.0		八戸市	市川町	7/12	0
		晴山	7/12	26.0			豊崎	7/12	0
	十和田湖町	下洗	7/11	0			豊崎	7/12	0
	七戸町	和田	7/11	16.0		五戸町	豊崎	7/12	2.0
	天間林村	蒼前	7/11	100			扇田	7/12	0
		馬込	7/13	48.0			梅内	7/13	68.0
		後平	7/13	6.0			豊川	7/13	0
		後平	7/13	58.0			斗内	7/13	0*
下 北	三沢市	深谷	7/12	0		三戸町	貝森	7/14	100
	上北町	大洞	7/11	14.0			貝森	7/14	100
		境ノ沢	7/11	6.0			貝森	7/14	100
	野辺地町	清水目	7/11	0*		名川町	上名久井	7/12	0
	むつ市	金曲	7/11	12.0			田子町	雀ヶ平	7/11
		近川	7/14	0			飯豊	7/11	36.0
		奥内	7/14	4.0			茂市	7/11	0
		中野沢	7/14	2.0			* 周辺ほ場で発生がみられている		

4 防除対策

- (1) 出穂前に葉いもちの防除を必ず実施する。
(出穂期は7月末～8月1半旬と予想される。)
- (2) 発生が多く、防除後も急性型病斑が増えるようであれば、4～5日間隔で1～2回追加防除する。降雨が続くような場合であっても、雨の合間にみて薬剤を散布する。
- (3) 多発しているほ場または多発の恐れがあるほ場では、治療効果の高い剤(プラシン剤・ノンプラス剤)を使用する。
- (4) 連続散布する場合には同じ種類の薬剤を連用しない。